EA CADAR 2013 – GABARITO OFICIAL

ESPECIALIDADE: CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL

VERSÃO A	
QUESTÃO	GABARITO
31	C
32	B
33	A
34	D
35	B
36	D
37	#
38	#
39	D
40	C
41	D
42	C
43	#
44	B
45	C
46	C
47	#
48	D
49	A
50	C
51	C
52	A
53	B
54	D
55	B
56	A
57	A
58	B
59	D
60	D

VERSÃO B	
QUESTÃO	GABARITO
31	C
32	B
33	#
34	C
35	D
36	C
37	D
38	#
39	#
40	D
41	B
42	D
43	A
44	B
45	C
46	D
47	D
48	B
49	A
50	A
51	B
52	D
53	B
54	A
55	C
56	C
57	A
58	D
59	#
60	C

- **As questões com # foram anuladas;**
- **As questões <u>sublinhadas</u> tiveram o gabarito alterado;**
- **As demais questões permaneceram inalteradas.**

JUSTIFICATIVAS DA BANCA EXAMINADORA PARA ANULAÇÃO DAS QUESTÕES

37 VERSÃO A / 39 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

No gabarito comentado observa-se a indicação da alternativa “D” como resposta correta, ou seja, valores variando de 90 a 105°. Entretanto, observando a questão, pode-se verificar que a alternativa “C” prevê valores variando de 85 a 115°. Ocorre que os valores da alternativa “D” estão contidos nos valores da alternativa “C”. Dessa forma, se fosse assumido um valor de 95° para esse ângulo, estariam corretas tanto a alternativa “D”, quanto a alternativa “C”.

38 VERSÃO A / 38 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

A questão assemelha-se a uma outra utilizada em um concurso público anterior. Em atenção a transparência e a isonomia deste certame, a Banca decide pela anulação da questão.

43 VERSÃO A / 33 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

O aumento nos níveis de glicose durante o uso prolongado de corticóides é causado por um processo chamado gliconeogênese. Esse processo é distinto do processo conhecido com glicogênese. Dessa forma, a questão apresenta duas respostas corretas (letras A e B).

47 VERSÃO A / 59 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

A referência bibliográfica adotada para essa questão cita que "uma média de 10% a 20% de recorrências tem sido relatadas após a enucleação e curetagem dos ameloblastomas unicísticos". Os autores não fazem diferenciação entre os tipos de tumores unicísticos. Além disso, essa taxa de 10% a 20%, por se tratar de uma média, é praticamente a mesma que a do ameloblastoma periférico 15% a 20%. Dessa forma, a questão não apresenta resposta correta**.**

JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA PARA AS MUDANÇAS DE GABARITO

40 VERSÃO A / 36 VERSÃO B

GABARITO ALTERADO PARA ALTERNATIVA “C”.

O enunciado da questão pede que seja marcada a alternativa INCORRETA. A alternativa “D” apontada como resposta no gabarito, apresenta uma afirmativa verdadeira, pois, de acordo com Neville, as duas lesões apresentam dor. Entretanto a alternativa “C” afirma que as duas lesões produzem prostaglandina. Neville cita que apenas o osteoma osteóide apresenta produção de prostaglandina. Sendo assim, a letra C é o gabarito correto.

57 VERSÃO A / 49 VERSÃO B

GABARITO ALTERADO PARA ALTERNATIVA “A”.

Analisando o gabarito comentado, conclui-se que as alternativas III e IV também estão corretas. Sendo assim, o gabarito deverá ser alterado, tendo como resposta correta a letra A.