EA - CAMAR 2013 – GABARITO OFICIAL

ESPECIALIDADE: PSIQUIATRIA

VERSÃO A	
QUESTÃO	GABARITO
31	D
32	A
33	A
34	A
35	A
36	D
37	A
38	C
39	A
40	B
41	A
42	A
43	B
44	D
45	D
46	B
47	#
48	D
49	#
50	C
51	A
52	C
53	B
54	D
55	D
56	D
57	A
58	B
59	B
60	C

VERSÃO B	
QUESTÃO	GABARITO
31	D
32	D
33	B
34	A
35	A
36	B
37	A
38	C
39	A
40	D
41	A
42	A
43	A
44	A
45	D
46	C
47	B
48	B
49	A
50	D
51	D
52	D
53	B
54	C
55	A
56	C
57	#
58	D
59	#
60	B

- **As questões com # foram anuladas;**
- **As questões sublinhadas tiveram o gabarito alterado;**
- **As demais questões permaneceram inalteradas.**

JUSTIFICATIVAS DA BANCA EXAMINADORA PARA ANULAÇÃO DAS QUESTÕES

47 VERSÃO A / 59 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA
A agnosia (incapacidade de orientar-se e reconhecer fisionomias e objetos sem que haja déficit sensorial ou sensitivo) também ocorre com frequência. Sua capacidade de juízo crítico é afetada, podendo gerar atitudes inadequadas, sendo essas situações as que normalmente chamam a atenção dos familiares. Outros comprometimentos como alterações de sono e de humor, déficit de locomoção, desintegração da personalidade, diminuição da afetividade e perda de controle esfincteriano também podem ocorrer. O enunciado da questão solicita a alternativa incorreta, entretanto as quatro alternativas estão corretas.

49 VERSÃO A / 57 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA
Nenhuma das alternativas citadas atendem ao solicitado na questão acerca da região do sistema nervoso central mais fortemente relacionada à etiopatogenia do ***delirium.***

JUSTIFICATIVAS DA BANCA EXAMINADORA PARA AS MUDANÇAS DE GABARITO

48 VERSÃO A / 58 VERSÃO B

GABARITO ALTERADO PARA ALTERNATIVA “D”.

O transtorno do sono mais comumente encontrado na depressão é a insônia, definida como dificuldade de iniciar e manter o sono...

52 VERSÃO A / 54 VERSÃO B

GABARITO ALTERADO PARA ALTERNATIVA “C”.

Considerando o déficit de atenção e hiperatividade, a alternativa que não apresenta uma comorbidade é a C.
Problemas de afetividade podem acompanhar o déficit de atenção e hiperatividade como um aspecto secundário, e ansiedade por si só pode ser manifestada por hiperatividade e fácil distratibilidade.